

抗 悪 性 腫 瘍 剤 治 療 プ ロ ト コ ー ル 一 覧

津田沼中央総合病院

2026.3.7.更新

適応疾患 療法名	薬剤 1日投与量・方法	投与時間	投与日	投与ルート	投与間隔、総コース	主な副作用	適応
白血病	Hydroxy carbamide療法 Hydroxy carbamide 500～2000mg／日 分1～3、適宜増減あり (寛解後維持 500～1000mg、分1～2、適宜増減)		連日	経口	連日経口投与	骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、	多発性骨髄腫(慢性骨髄性白血病、真性多血症、 本態性血小板血症)
	imatinib (IMA)療法 imatinib 400～800mg／日 (慢性期)400mg1×食後 600mgまで (移行期)600mg1×食後 800mg →※400mgを1日2回まで		連日	経口	連日経口投与	骨髄抑制、悪心・嘔吐、浮腫、皮疹、 肝機能障害	慢性骨髄性白血病
	ニロチニブ療法 ニロチニブ 1回 400mg 1日2回 食事の1時間以上前又は食後2時間以降 (初発)1回300mg 1日2回		連日	経口	連日経口投与	発疹、頭痛、吐き気、嘔吐、貧血、発 熱、かゆみ、脱毛症、QT延長	慢性期又は移行期の慢性骨髄性白血病
	ダサテニブ療法 ダサテニブ 70～140mg/回 1日1-2回 (慢性骨髄:慢性期)1回100mg 1日1回 (慢性骨髄:移行・急性期)1回70mg(-90mg)1日2回 (急性リンパ)1回70mg(-90mg) 1日2回		連日	経口	連日経口投与	骨髄抑制、悪心・嘔吐、頭痛、下痢、 浮腫、発疹、肝機能障害	慢性骨髄性白血病・ 再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ 性白血病
	白血病ベンダムスチン単剤療法 トレアキシン注 100mg／m2／日	60分	DAY1・2	点滴静注DIV	投与期間は4週間を1クール として、4－8コース行う	骨髄抑制、悪心・嘔吐、便秘、下痢 口内炎、肝機能異常、鼻咽頭炎、 味覚異常、頭痛、不眠、クレアチニン上昇 発疹、注射部位反応、	慢性リンパ性白血病
	アナグレリド療法 アグリリンカプセル0.5mg 1回0.5mgを1日2回より開始 増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として 0.5mgずつ行い、1日4回を超えない範囲で 1回用量2.5mgかつ1日用量10mgを超えない		連日	経口	連日経口投与	心障害、QT延長・心室性不整脈、 間質性肺炎、出血、血栓塞栓症、 骨髄抑制、頭痛、呼吸困難、 下痢、肝酵素上昇、末梢性浮腫、疲	本態性血小板血症
	イブルチニブ単剤療法 イムブルピカカプセル 420mg/日(140-420mg)		連日	経口	連日経口投与	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、 疲労 皮膚・爪障害、間質性肺炎、 肝機能障害、出血、不整脈	慢性リンパ性白血病
	ボスチニブ療法 ボシュリフ錠 初発慢性期の慢性骨髄性白血病:400mg それ以外の場合:500mg 最大600mgまで		連日	経口	連日経口投与	肝機能障害、下痢、骨髄抑制、 体液貯留、心障害、悪心・嘔吐、腹痛、 疲労、食慾減衰	慢性骨髄性白血病
	Venetoclax＋Aza療法 アザシチジン 75mg／m ² ／日 1日1回 ベネトクラクス 1日1回 食後 1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg その後維持期は400mg	点滴静注は10分	DAY1－7 連日	皮下 点滴静注DIV 経口	7日間投与 その後21日間休業 連日経口投与	骨髄抑制・感染症・出血 肺・心臓・肝臓・腎臓障害 低血圧・ショックアナフィラキシー症状 便秘	急性骨髄性白血病
	Venetoclax＋LDAC療法 シタラビン 20mg／m ² ／日 1日1回 ベネトクラクス 1日1回 食後 1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg 4日目600mg、その後維持期は600mg	点滴静注は10分	DAY1－10 連日	皮下 経口	10日間投与 その後18日間休業 連日経口投与	骨髄抑制・感染症・出血 肺・心臓・肝臓・腎臓障害 低血圧・ショックアナフィラキシー症状 便秘	急性骨髄性白血病
	ルキシソリチニブ単剤療法 ジャカビ錠 骨髄線維症:10-50mg/日 1日2回 真性多血症:20-50mg/日 1日2回		連日	経口	連日経口投与	骨髄抑制・感染症・出血、 肝機能障害、体重増加、下痢、疲労 食慾減衰、不眠症、頭痛・めまい、 高血圧、悪心・嘔吐・便秘・口内炎	骨髄線維症 真性多血症

	アシミニブ単剤療法 セムブリックス錠 80mg/日 1日2回		連日	経口	連日経口投与	骨髄抑制・感染症、 頭痛、悪心、発疹、疲労、 膝炎、QT延長、脳梗塞・心筋虚血、 光線過敏症、高血圧	慢性骨髄性白血病
	イブルチニブ・ベネトクラクス療法 イムブルピカ カプセル 420mg/日 1日1回 ベネクレクスタ錠 1日1回		連日 連日	経口 経口	連日経口投与 総コース数：15コース	骨髄抑制・感染症・出血、下痢・便秘、 皮膚・爪障害、間質性肺炎、肝機能障害、 アナフィラキシー症状、 悪心・嘔吐、食欲減退、不整脈、 発疹・挫傷、頭痛、口内炎、疲労、 関節痛・筋肉痛、発熱、末梢性浮腫、 腫瘍崩壊症候群	慢性リンパ性白血病
	モメロチニブ単剤療法 オムジャラ錠 200mg/日 1日1回		連日	経口	連日経口投与	骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、 間質性肺炎、悪心・嘔吐、疲労、無力症、 浮動性めまい、回転性めまい、錯感覚、 末梢性ニューロパチー、霧視、関節痛、 発疹、頭痛、ビタミンB1欠乏、低血圧	骨髄線維症