

適応疾患 療法名	薬剤 1日投与量・方法	投与時間	投与日	投与ルート	投与間隔、総コース	主な副作用	適応
肺癌	S-1単剤 TS-1(体表面積計算) 1日2回 1.25㎡未満 40mg/回 1.25㎡-1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回		DAY1-28	経口	1コース42日 4週投与2週休薬	骨髄抑制、悪心嘔吐、食欲不振、発疹、下痢、全身倦怠感、口内炎、色素沈着、流涙	TS-1は体表面積あたり投与量/回異なる。
	GEM単剤 GEM 1000mg/㎡/day	30分かけて	DAY1、8、15	点滴静注DIV	週1回投与を3週連続し、4週目休薬を1コースとして投与を行う 1コース28日	骨髄抑制、悪心嘔吐	
	S-1+GEM GEM 1000mg/㎡/日 TS-1(体表面積計算) 1日2回 1.25㎡未満 30mg/回 1.25㎡-1.5㎡未満 40mg/回 1.5㎡以上 50mg/回	30分かけて	DAY1、8 DAY1-14	点滴静注DIV 経口	週1回投与を2週連続し、3週目休薬を1コースとして投与を行う 1コース21日	骨髄抑制、悪心嘔吐、食欲不振、発疹、下痢、全身倦怠感、口内炎、色素沈着、流涙	TS-1は体表面積あたり投与量/回異なる。
	FOLFIRINOX L-OHP 85mg/㎡/日 CPT-11 180mg/㎡/日 I-LV 200mg/㎡/日 5-FU 400mg/㎡/日 5-FU 2400mg/㎡/46時間	2時間かけて 90分かけて 2時間かけて 急速 46時間かけて	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 DAY1-3	点滴静注DIV	1コース14日	骨髄抑制、発熱性好中球減少症、末梢神経障害、悪心嘔吐、下痢	治癒切除不能な肺癌
	nab-PTX+GEM nab-PTX 125mg/㎡/日 GEM 1000mg/㎡/日	30分かけて 30分かけて	DAY1、8、15 DAY1、8、15	点滴静注DIV	1コース28日	骨髄抑制、末梢神経障害、間質性肺炎 黄斑浮腫、悪心嘔吐	治癒切除不能な肺癌
	FL+nal-IRI nal-IRI 70mg/㎡/日 I-LV 200mg/㎡/日 5-FU 2400mg/㎡/日	90分かけて 2時間かけて 46時間かけて	DAY1 DAY1 DAY1-3	点滴静注DIV	1コース14日	骨髄抑制、発熱性好中球減少症、悪心嘔吐、下痢、脱毛、口内炎	治癒切除不能な肺癌
	mFOLFIRINOX L-OHP 85mg/㎡/日 CPT-11 150mg/㎡/日 I-LV 200mg/㎡/日 5-FU 2400mg/㎡/46時間	2時間かけて 90分かけて 2時間かけて 46時間かけて	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1-3	点滴静注DIV	1コース14日	骨髄抑制、発熱性好中球減少症、末梢神経障害、悪心嘔吐、下痢	治癒切除不能な肺癌